

TRUPOZYM[®] CCK

Beizenzym

Aussehen:	gelbliches Pulver
Wirksubstanz:	proteolytische Enzyme auf natürlicher Pankreasbasis
Aktivität:	3 000 LVE/g, (TEGEWA-Methode, methodenbedingte Messtoleranz \pm 10 %)
pH-Wert (1 : 10):	ca. 6

Eigenschaften:

TRUPOZYM CCK ist ein ammonsalzfreies Beizmittel auf Pankreasbasis.

TRUPOZYM CCK ist optimal wirksam im pH-Bereich 7 – 9.

TRUPOZYM CCK lockert die Hautstruktur sehr schonend auf, lockert den Grund sehr gut und führt zu einem elastischen, feinen und festanliegenden Narben.

TRUPOZYM CCK ist für alle Ledertypen geeignet.

Anwendungshinweise:

Die Zugabe von **TRUPOZYM CCK** erfolgt ungelöst, normalerweise 20 - 60 Min. nach dem Entkalkungsmittel. Die Beiztemperatur liegt in der Regel zwischen 32 und 37 °C.

Intensiver ist die Beize bei 37 °C, narbenschonender und gleichmäßiger bei 32 °C, wobei in diesem Fall eine etwas längere Beizdauer notwendig ist.

Der pH-Wert während der Beize sollte zwischen 6 und 9 liegen. Die Trägersubstanzen für die Enzyme sind so gewählt, dass die Aktivität moderat und gleichmäßig freigesetzt wird. So erhält man einen sehr gleichmäßigen Beizeffekt.

Hinweise zur Dosierung:

Rind, Polsterleder	0,3 – 0,8 %	TRUPOZYM CCK	60 – 120 Minuten
Rind, Oberleder	0,1 – 0,6 %	TRUPOZYM CCK	30 – 60 Minuten
Schwein, Bekleidungsleder	0,8 – 1,5 %	TRUPOZYM CCK	210 – 360 Minuten
Schwein, Oberleder	0,4 – 1,0 %	TRUPOZYM CCK	90 – 180 Minuten

Sicherheit und Lagerung:

Beim Umgang mit **TRUPOZYM CCK** sind die beim Arbeiten mit Chemikalien allgemein üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Auf Hinweise in den Sicherheitsdatenblättern ist zu achten.

Bei trockener und kühler Lagerung kann **TRUPOZYM CCK** bis zu 24 Monaten gelagert werden.