

TRUPOSEPT® FC

Fungizid

Aussehen:	hellbeige Emulsion
Wirksubstanz:	Mischung aus Octylisothiazolon + Carbendazim
pH-Wert (1 : 10):	ca. 7

Eigenschaften:

TRUPOSEPT FC ist ein voll biologisch abbaubares und wenig geruchsintensives Fungizid.

TRUPOSEPT FC ist frei von TCMTB.

TRUPOSEPT FC zieht rasch und gleichmäßig auf die Haut auf.

TRUPOSEPT FC ist wirksam im pH-Bereich von 2 bis 7.

TRUPOSEPT FC eignet sich zur fungiziden Ausrüstung von wet-blue, wet-white und vegetabil gegerbten Ledern.

Anwendungshinweise:

Wet-blue:

Je nach Lagerdauer und klimatischen Bedingungen wird für eine ausreichende Konservierung 0,1 – 0,3 % **TRUPOSEPT FC**, bezogen auf Blößengewicht, während der Chromgerbung zugegeben.

Für einen zusätzlichen Oberflächenschutz wird eine Dosierung von 0,03 % **TRUPOSEPT FC** am Ende der Gerbung oder im Waschwasser empfohlen.

Wird in der Chromgerbung ein Fettungsmittel wie z. B. **TRUPON® PEM** verwendet, erfolgt die Zugabe von **TRUPOSEPT FC**, nachdem das Fettungsmittel aufgezogen ist.

Wet-white:

0,15 – 0,4 % **TRUPOSEPT FC**, bezogen auf Blößengewicht, werden während der Vorgerbung zugegeben. Auch hier ist die Dosierung abhängig von Lagerdauer und klimatischen Bedingungen.

Wird in der Vorgerbung ein Fettungsmittel wie z. B. **TRUPON® PEM** verwendet, erfolgt auch hier die Zugabe von **TRUPOSEPT FC**, nachdem das Fettungsmittel aufgezogen ist.

Vegetabilleder:

Die Dosierung in der Vegetabilgerbung beträgt 0,3 – 0,6 % **TRUPOSEPT FC**, bezogen auf Blößengewicht. Auch hier gelten die Hinweise bezüglich der Verwendung eines Fettungsmittels, wie bereits beschrieben.

Anmerkungen:

- die empfohlenen Einsatzmengen von **TRUPOSEPT FC** sind Richtwerte. Klimatische Einflüsse sowie Lagerbedingungen, Art der Häute und Felle und Arbeitsweisen sind in Betracht zu ziehen.
- zur besseren Verteilung sollte **TRUPOSEPT FC** vor der Zugabe 1 : 3 verdünnt werden.
- reduzierend wirkende Chemikalien wie z.B. Natriumbisulfit sollten nicht direkt zusammen mit **TRUPOSEPT FC** eingesetzt werden.

Sicherheit und Lagerung:

Beim Umgang mit **TRUPOSEPT FC** sind die beim Arbeiten mit Chemikalien allgemein üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Auf Hinweise in den Sicherheitsdatenblättern ist zu achten.

TRUPOSEPT FC kann bis zu 24 Monaten gelagert werden, wenn die Temperaturen nicht unter 5 °C und nicht über 40 °C liegen.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.